

Observation

n° 41.

I

Sur une playe penetrante dans la Cavité
de la poitrine, avec fracture d'une cote,
et lésion au poulmon; pour la quelle
il a fallu pratiquer l'operation de

L'Empieme



Par M. Lamoignon, Correspondant de
l'Académie Royale de Chirurgie de
Paris, Chirurgien Major au Régim^t
des Gardes Infanterie Wallonnes, et
membre du Collège Royal de Chirurgie
de Barcelonne

Le Nomme la Grandeur, Soldat
de la Comp^{te} de M^r. Desmerziers du Régim^t
des Gardes Wallonnes, age de trente ans ou
environ, d'une complexion robuste, fut
blessé par son Camarade le 18 de Juillet.

ARC

47

n° 32

1768. à cinq heures après midy) avec un
Couteau assez grand, lequel étoit lié au bout
d'un bâton assez fort. Malheureux instruments
dont nos Soldats ne se servent que trop —
Souvent; leur étant expressément défendu
de porter leurs armes, n'étant pas de service. f.

La blessure, qui avoit deux pouces de
longueur, étoit obliquement sous l'épaule —
droite, pénétrait la cavité de la poitrine et
blessait le poulmon, la troisième vraie —
cotte, en comptant du haut en bas étoit
fracturée; ce qui n'empêcha le malade
(à ma grande surprise f. de s'occuper avec ses
Camarades, et de rester jusqu'à onze heures
du soir sans demander du secours; mais enfin
ne pouvant plus supporter son mal avec la même
tranquillité; il fut obligé à demander les
secours de l'art, ne pouvant plus s'en tenir
à ceux de la simple nature: on appella, en
conséquence, un de mes aides, lequel, après
avoir attentivement examiné la blessure,
trouva que la portion postérieure, de la cotte.

3
fracturée, étoit beaucoup plus élevée que la
portion Antérieure, la première chose qu'il
fit fut d'en faire la réduction; a quoy il ne
reussit pas, sans peine, après quoy il pensa
la playe selon les regles de St. Art.

J'arrivay immédiatement après, et trouvay
le blessé avec beaucoup de fièvre, grande
difficulté de respirer, et beaucoup de soif.

La Relation exacte que me fit mon Ayde,
de l'état de la blessure, m'obligea à faire
soigner copieusement le malade, Je la fis
reiterer deux autres fois jusqu'à sept heures
du matin: Je le mis à une diette stricte, et à
l'usage de l'eau panée. Le second jour; Je
trouvay encore mon malade avec beaucoup de
fièvre, et la respiration plus opprimée: c'est
pourquoy Je le fis encore soigner deux fois,
et lui fis donner un laxement l'après-midy.
et la soif étant très considérable, Je lui fis
faire une pthiase fort légère, avec la fleur
de Mauves, et la Peronique, dans laquelle on



mettoit un peu de nitre.

Le troisieme jour: les accidens etant les memes, Je fis reiterer la saignée deux autres fois, Je fis donner un autre lavement, et continuer la meme diette. la playe fut pensée jusqu'à ce jour avec le vin rouge, et le sucre (le meilleur baume que j'aye experimenté pour les blessures faites par instruments tranchants et pointus).

Le quatrieme jour: les accidens estoient presque les memes, et voyant mon malade avec assez des forces, Je le fis encore saigner deux fois, luy fis donner un autre lavement, et la meme diette fut continuée.

Le Cinquieme jour: nous vîmes en levant l'appareil, qu'il sortoit de la playe beaucoup de matiere ichoreuse, et de mauvaise qualite, ce qui m'obligea à la faire penser avec la decoction vulneaire, dans laquelle on mettoit le rodometis: avec laquelle on

5
lavoit bien la playe et on la pensoit avec
les plumaceaux trempes dans la ditte liqueur,
ayant soin auparavant de mettre un bouillonnet
trempé, et exprimé dans l'eau de vie, sur la
cotte fracturée: dont les deux bouts se maintin-
rent reunis constamment tout le temps du
traitement, qui fut cependant assez long: comme
on le verra cy après.

La playe fut pansée, jusques au neuvième
jour de la maladie, avec la meme decoction, et
je fis observer la meme diette, et fis donner
quelques lavemens. Je m'apperçus ce meme
jour que les matieres avoient augmenté la
playe en sa partie postérieure, et sous les
legumens, ce qui fut cause que j'importay
une partie de ceux cy, parcequ'ils étoient
détachés, et comme macerés. Le Malade resta
avec beaucoup de fièvre, difficulté de respirer,
et beaucoup d'oppression jusques au quinzième
jour; Je m'apperçus alors, que la matiere
sortoit en partie de la cavité de la poitrine;
mais avec grande difficulté, parueque



L'ouverture de la pleure étoit fort petite ce qui me déterminâ à y faire avec le bistouri une dilatation, mais elle devint presque inutile, puisque les matières contenues dans la cavité n'en pouvoient sortir que fort peu, et très difficilement, quoique je fisse mettre le malade dans la situation la plus convenable

Voyant donc que mon malade alloit toujours de mal en pis, et que les matières du poulmon suppuré, épanchées sur le diaphragme, ne pouvoient sortir par la playe, qui étoit trop haute: Je me résolus à faire l'opération de l'empyeme, le 18^e jour de la blessure

Je fis l'opération, selon les regles prescrites par les Auteurs modernes, mais le malade se trouvant fort foible, et souffrant beaucoup, je le fis coucher horizontalement sur le côté gauche, pendant tout le temps de l'opération: parueque c'étoit pour lui l'attitude la plus supportable: après avoir fait les incisions nécessaires, et ouvert les tegumens, muscles, et la pleure, je me sis -

1
point sortir de la matiere cecy ne me surprit
nullement voyant la position du malade, car
il auroit fallu que la cavité eut été extrê-
mement remplie, pour que la matiere fût
sortie en gardant la même situation: Je le
fis en consequence coucher sur son dos, et
alors il sortit environ deux livres de matiere,
ayant la même couleur cendrée, et odeur que
celle qui sortoit par la playe.

La playe fut pansée avec une languette
de linge fin, qu'on introduisit jusqu'à
l'ouverture de la pleure, et on mit le reste
de l'appareil convenable.

Le Malade se trouva ce même jour un peu
mieux, et la nuit fut plus tranquille.

Le lendemain Je le trouva avec moins de
fièvre, et la respiration plus libre: la Diète
fut par consequent moins severe: puis-
que Je fis mettre un fauce d'œuf dans son bou-
illon deux fois par jour: les playes furent
infectées en commençant toujours par la
Supérieure, et le reste de l'appareil étoit
mis méthodiquement, mais le côté où Je



fis l'operation etant fort edemateux, la playe
 de l'operation devint fort corrodde quoy que on
 l'eut pensée avec un digestif anime, qu'il
 fallut necessairement abandonner, a cause des
 grandes Douleurs, que toute sorte, d'onguens
 causoient a mon malade, Jusques meme a le
 priver des douceurs du sommeil, tout ce qui
 m'obligea a le faire panser avec une deco-
 ction vulneraire dans laquelle on trempoit
 les plumaceaux, moyenant quoy il se
 trouvoit sans douleurs, et la playe se
 delargea, et incarnaa parfaitement en peu
 de jours. Je fis continuer les injections
 qui furent toujours avec la decoction d'
 Orge, et le miel rosat, ou avec la decoction
 vulneraire simple, assez longtemps: parce
 qu'elles ne causoient point de toux au
 malade; mais elles n'entroient que tres
 difficilement, par la playe superieure, trois
 ou quatre jours apres; et cette meme playe,
 qui avoit auparavant fort mauvaise couleur,
 et les chairs fort baveuses chargees favorable-
 ment a vue d'œil, a mesure qu'on —

201
reprimoit les chairs par les moyens des
scarotiques, et dessicatifs.

La Cotte qui se trouvoit decouverte d'une
bonne portion aux bords de la fracture, se
couvrit bien tôt de bonnes chairs, et la dite
fracture, s'étant toujours tenue bien réunie,
le Calus se fit en peu de temps, de sorte que
la playe supérieure fut parfaitement cic-
atrisée vingt jours après l'opération.

Les matières qui sortirent par la playe
de l'opération, furent en assez grande
quantité les quinze premiers jours; mais
elles diminuèrent insensiblement, tantôt
plus tantôt moins.

Voyant que mon malade avoit toujours
un peu de fièvre, et une légère toux, je
le mis à l'usage d'une decoction pectorale,
et vulnéraire avec un bolus de baume de
Soufre Theriacal, deux fois par jour,
et ensuite à celui du perou liquide, en
lui faisant prendre de temps en temps
à l'heure du sommeil un bolus de six
grains d'opiat de Linoglore ou de Storacé.



Vidui. Je lui permis en même temps plus d'aliment, et à mesure que l'appétit revint, Je luy augmentay les aliments solides. Le malade eut enfin assez de force pour se lever, et se promener un peu par la chambre, vingt cinq jours après l'opération.

Quoy que il fut traité, comme on l'a vu, methodiquement, tant pour les remèdes externes que pour les internes, et qu'avec cela il prit des forces, cela n'empêcha pourtant pas, que la Suppuration ne durât jusques à la fin de Septembre quoique l'opération fut faite depuis le trois d'Avril. la playe étant alors bien détergée, et incarnée, elle fut parfaitement cicatrisée vers le 10 d'Octobre; de sorte que le blessé resta environ trois mois pour être parfaitement guery de la blessure, et de l'opération: et il est aujourd'hui bien portant, faisant son service, et sans avoir la Respiration gênée, ny la moindre incommodité.

Reflexions

19

N'est il pas surprenant, que ce Malade ait peu résister à une blessure si dangereuse sans demander du Secours que six heures après et qu'il ait pu s'appuyer avec ses Camarades, et aller à l'appel sans donner la moindre marque de son mal ? il est prudent de croire que les accidens n'auroient pas été si graves à beaucoup près s'il avoit été secouru peu de temps après avoir été blessé.



Il faut observer que le malade ne cracha ny sang ny matière, pendant tout son traitement, et qu'il n'eut point d'emphysème autour de la playe, quoique son poulmon fut blessé, à n'en point douter par les accidens dont j'ay fait mention; on doit conjecturer que la blessure du poulmon fut très petite: car j'ay vu pour des malades d'une très légère blessure au poulmon, et sans avoir craché du sang; et en faisant

L'ouverture du cadavre on trouvoit une grande partie du poulmon gangrenée.

On a vu aussi des Empièmes a la suite d'une peripneumonie supurée, que les malades n'ont point craché de la matiere.

Je n'ay pas non plus, été surpris qu'il n'y ait pas eu d'Emphysème; la principale raison est selon mon avis, parueque la playe extérieure étoit fort grande et parallèle a l'ouverture de la pleure.

Mais il est constant que la blessure du poulmon de mon malade, quoique petite, ce sera inflammée, et que celle cy ce sera terminée par supuration; de telle sorte que j'ay lieu de croire que le lobe droit du poulmon aura été entièrement détruit, ou qu'au moins il y en aura resté fort peu: puisque quand on lui injectoit par la playe de l'opération, il lui entroit fort facilement une grande quantité de liquide; et d'ailleurs on y trouvoit un grand vuide.

Peut être critiquera t'on les injections que

J'ay pratiquées dans cette cure, au moins -
 M^r Prillon n'en paroît pas fort partisan
 dans ces sortes de cas (2) voy. Prix de l'
 Académie Royale de Chirurgie Tome 3.^e.)
 mais j'ay fait observer qu'elles ne causèrent
 ny toux, ny autres symptômes au malade
 qui fissent croire qu'elles étoient nuisibles:
 sans quoy je les auray aussitôt supprimées.

Je ne suis pas surpris que le blessé
 soit bien portant, malgré que le lobe
 droit de son poulmon soit détruit;
 car on a vu vivre fort long temps, et
 bien faire toutes ces fonctions à des
 personnes qui n'avoient qu'une
 petite portion du poulmon, et même
 d'un seul côté, comme on l'a vu par
 l'ouverture des Cadavres.

On pourroit donner d'autres raisons
 sur ces phénomènes, que j'omet, pour
 ne pas être prolix. Laisant aux -



14
51

Scavans de cette illustre société, le soin
de faire les autres Reflexions dont cette
observation est susceptible —

Barcelone le 10^e 7bre 1771 = Lante =

